

ارتباط مثبت فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسیریدمیک با اختلال متابولیک در افراد با سابقه‌ی فامیلی دیابت

مریم زارع^۱، احمد اسماعیل‌زاده^۱، مرضیه صادقی^۱، لیلا آزادبخت^۱، نجم‌اوه محوری‌فر^۱، مرضیه امینی^۱، دکتر مسعود امینی^۱

(۱) مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ (۲) دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ نشانی مکاتبه‌ی نویسنده‌ی مسئول: اصفهان، خیابان خرم، مرکز تحقیقاتی حضرت صدیقه‌ی طاهره، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی اصفهان، مریم زارع e-mail: mehr_mzare@yahoo.com

چکیده

مقدمه: از بین روش‌های غربالگری، امروزه بیشتر از شاخص‌های تن‌سنجدی به همراه سایر شاخص‌های بیوشیمیایی استفاده می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارتباط فنوتیپ (Enlarged Waist Elevated Triglyceridemic; EWET) با اختلال‌های متابولیکی در افراد با سابقه فامیلی دیابت صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در ۱۳۲۳ فرد (۳۳۲ مرد و ۹۹۱ زن) ۳۵–۵۵ ساله انجام شد. وزن، قد و دور کمر طبق روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. نمونه‌ی خون ناشتا گرفته و آزمایش‌های قند و چربی‌های خون با استفاده از کیت‌های تجاری انجام شد. هم‌چنین آزمون تحمل گلوکز خوراکی انجام شد. اختلال تحمل گلوکز به صورت $2\text{hpg} < 200 \leq 140$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و دیابت به صورت $\text{FBS} \geq 126$ یا ≥ 200 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در دو آزمایش متوالی تعریف شد. فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسیریدمیک (EWET) به صورت داشتن هم‌زمان دور کمر بزرگ‌تر از 102 در مردان و 88 سانتی‌متر در زنان و تری گلیسیرید بزرگ‌تر از 150 mg/dL میلی‌گرم در دسی‌لیتر در هر دو جنس تعریف شد. یافته‌ها: شیوع فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسیریدمیک در مردان $9/6\%$ و در زنان $23/6\%$ بود. مردان و زنان مبتلا به فنوتیپ EWET، دارای میانگین شاخص‌های تن‌سنجدی بالاتری در مقایسه با سایر گروه‌ها بودند. در مردان پس از تعدیل اثر سن و فعالیت فیزیکی، افراد مبتلا به EWET مقادیر بالاتر، کلسیتروول $(P < 0/001)$ ، فشارخون سیستولی $(P < 0/001)$ و دیاستولی $(P < 0/001)$ داشتند. تفاوت‌ها پس از تعدیل اثر BMI معنی‌دار باقی ماندند اما در مورد HDL این ارتباط مشاهده نگردید. زنان مبتلا به EWET قبل و بعد از تعدیل BMI میانگین بالاتری از قند، چربی‌های خون و فشار خون داشتند ($P < 0/001$). افراد مبتلا به EWET دارای شیوع بالاتر دیابت (در هر دو جنس) و IGT (در زنان) بودند ($P < 0/05$ برای همه). نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از ارتباط مثبت فنوتیپ EWET با بیماری دیابت است. استفاده از این فنوتیپ برای شناسایی زودرس افراد در معرض خطر دیابت و اختلال تحمل گلوکز خوراکی پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی: دور کمر هیپرتری گلیسیریدمیک، دیابت، تن‌سنجدی، اختلال تحمل گلوکز

دریافت مقاله: ۸۷/۸/۲۷ – دریافت اصلاحیه: ۱/۱۴ – پذیرش مقاله: ۸۷/۱/۱۸

مقدمه

مردان تهرانی ۱۹٪ گزارش شده است.^{۱۰} ارتباط این فنتیپ با عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی - عروقی تا حدود زیادی گزارش شده است اما مطالعه‌های قبلی خیلی کم به میزان شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکز در این گروه پرداخته‌اند. علاوه بر آن مطالعه‌های قبلی در افراد با سابقه‌ی فامیلی دیابت که استعداد بیشتری برای دیابت دارند انجام نشده است. با توجه به شیوع روزافزون دیابت و لزوم شناسایی عوامل مرتبط با شیوع آن، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط فنتیپ دور کمر هیپرتری‌گلیسریدمیک با شیوع دیابت در افراد با سابقه‌ی فامیلی دیابت در اصفهان انجام شد.

مواد و روش‌ها

بررسی حاضر یک مطالعه مقطعی بر پایه‌ی جمعیت است که در قالب مطالعه پیشگیری از دیابت - مطالعه آینده‌نگری که با هدف تعیین شیوع و شناسایی عوامل خطرزای دیابت و ایجاد شیوه‌ی زندگی سالم برای بهبود این عوامل در مرکز تحقیقات ندد درون‌ریز و متابولیسم اصفهان در حال بررسی است، انجام شد. نمونه‌گیری برای مطالعه‌ی حاضر از بستگان افرادی که در مرکز تحقیقات ندد درون‌ریز و متابولیسم پرونده داشتند به صورت فراخوان، تلفن و از میان دعوت‌شدگان به کلاس‌های توجیهی انتخاب شدند. از بین ۱۴۵۰ فرد ۳۵۵۵ ساله که سابقه‌ی فامیلی دیابت در بستگان درجه‌ی اول (والدین یا خواهر و برادر) داشتند، اطلاعات در مورد جنس، سن، سطح سواد، فعالیت فیزیکی، سابقه‌ی بیماری و مصرف دارو گرفته شد. در مطالعه‌ی حاضر پس از حذف افرادی که از داروهای مؤثر بر بیماری‌های قلبی یا داروهای کاهنده سطح چربی و داروهای مؤثر بر بیماری‌های قلبی مصرف می‌کردند، ۳۳۲ مرد و ۹۹۱ زن در مطالعه باقی ماندند. این پژوهش توسط شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ندد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصویب و در آن از افراد مورد مطالعه رضایت‌نامه‌ی آگاهانه‌ی کتبی اخذ شد. وزن با حداقل پوشش و بدون کفش با استفاده از ترازوی سکا اندازه‌گیری و ثبت شد. قد افراد با استفاده از متر نواری سکا در وضعیت ایستاده و بدون کفش اندازه‌گیری و ثبت شد. نمایه‌ی توده‌ی بدن (BMI) از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه گردید. دور کمر در باریکترین

در حال حاضر دیابت یکی از علل عمدی مرگ و میر در بیشتر کشورهای توسعه یافته است.^۱ دیابت یک اختلال متابولیک است که منجر به عوارض زیادی مانند بیماری‌های قلبی، کلیوی و چشمی می‌شود.^۲ براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۲ میلیون بیمار دیابتی در ایران وجود داشته است و این تعداد در سال ۲۰۳۰ از مرز ۶/۴ میلیون نفر خواهد گذشت.^۳ شیوع دیابت در اصفهان ۷/۵٪،^۴ تهران ۵/۴٪،^۵ زنجان ۵٪،^۶ یزد ۱۶/۳٪ و بوشهر ۱۲/۶٪ گزارش شده است.^۷ شیوع دیابت در کسانی که سابقه‌ی فامیلی دیابت دارند. در مردان تهرانی ۳۲/۳٪ و در زنان تهرانی ۴۰/۷٪ گزارش شده است.^۸ از آن جا که دیابت برای سلامتی همه‌ی جوامع انسانی یک تهدید به شمار می‌رود^۹ لزوم غربالگری و تشخیص زودرس آن با استفاده از ابزارهای ساده از اهمیت به سزاوی برخوردار است.^{۱۰} برای شناسایی و تشخیص دیابت از شاخص‌های غربالگری متعددی استفاده می‌شود. در مطالعه‌های جدید شاخص‌های تن‌سنجدی را به عنوان یکی از ابزارهای ساده‌ی غربالگری پیشنهاد می‌کنند.^{۱۱} که می‌توانند در تشخیص و شناسایی زودرس بسیاری از بیماری‌های مزمن نقش داشته باشند.^{۱۲} از جمله‌ی این شاخص‌ها می‌توان به BMI اشاره کرد که چاقی عمومی را در یک فرد ارزیابی می‌کند. برخی مطالعه‌ها نشان می‌دهند که قدرت پیشگویی بیماری‌ها توسط شاخص‌های مربوط به چاقی شکمی بیشتر از BMI است.^{۱۳} به تازگی بیشتر مطالعه‌ها از بین شاخص‌های تن‌سنجدی، دور کمر را به عنوان یک شاخص مطلوب برای پیشگویی بیماری‌ها معرفی کردند.^{۱۴} از طرف دیگر بالا بودن دور کمر همراه با سطح بالای تری‌گلیسرید سرم به عنوان «فنتیپ دور کمر هیپرتری‌گلیسریدمیک» معرفی شده.^{۱۵} که از آن به عنوان یک راه ساده و ارزان برای شناسایی دیابت و بیماری‌های قلبی - عروقی نام برده شده است.^{۱۶} مطالعه‌ها نشان داده‌اند که فنتیپ دور کمر هیپرتری‌گلیسریدمیک یک ابزار ساده و قوی در پیشگویی تریاد متابولیک (بالا بودن سطح Apo B سرم، مقاومت به انسولین و بالا بودن سطح LDL-C کوچک و متراکم) است.^{۱۷} شیوع فنتیپ دور کمر هیپرتری‌گلیسریدمیک در ایران بالا است. به طوری که میزان شیوع آن در زنان تهرانی ۳۱/۹٪^{۱۸} و در

۳- افرادی که دارای دور کمر طبیعی و TG بالا بودندⁱⁱⁱ.(NWET)

۴- افرادی که دارای دور کمر بالا و TG بالا بودند^{iv}.(EWET)

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش ۱۳ انجام شد. برای مقایسه‌ی ویژگی‌های عمومی افراد مورد مطالعه در فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم، از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) برای متغیرهای کمی و آزمون مجذور خی برای متغیرهای کیفی استفاده شد. در صورت وجود تفاوت معنی‌دار در آنالیز واریانس یک طرفه از آزمون توکی استفاده شد تا مقایسه‌ی دو به دوی گروه‌ها انجام شود. میانگین‌های مربوط به متغیرهای متابولیکی بین فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم در مدل‌های مختلف با استفاده از GLM^v محاسبه شد. در مدل اول، اثر سن و فعالیت فیزیکی تعديل شدند. در مدل بعدی علاوه بر سن و فعالیت فیزیکی اثر نمایه‌ی توده‌ی بدن نیز تعديل شد تا معلوم شود که آیا تفاوت‌ها مستقل از چاقی هستند یا نه. برای مقایسه‌ی میانگین‌ها از آنالیز کوواریانس یا تصحیح بُن‌فروونی استفاده شد. ما هم‌چنین شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکز را در فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم محاسبه کردیم. برای مقایسه‌ی این شیوع‌ها از آزمون مجذور خی استفاده شد.

یافته‌ها

میانگین سن مردان و زنان مورد مطالعه به ترتیب ۵/۵ و ۴/۲±۰/۵ سال، میانگین BMIⁱⁱ ۴۲±۵/۶ و ۴۳±۵/۶ سال، میانگینⁱⁱⁱ ۲۷/۶±۲/۳، میانگین دور کمر^{iv} ۹۴/۴±۸/۶ و ۹۷/۶±۴/۵ کیلوگرم، میانگین نسبت دور کمر به بسن^v ۰/۰/۹±۰/۰/۰ و ۰/۰/۸±۰/۰/۰٪ بود. شیوع فنوتیپ EWET در مردان ۹/۶٪ و زنان ۶/۲٪ بود. مشخصات عمومی مردان مورد مطالعه به تفکیک فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم در جدول ۱ آمده است. تفاوت آماری معنی‌داری از نظر سن بین

ناحیه‌ی کمر^۶ و دور بسن در برجسته‌ترین قسمت آن اندازه‌گیری و نسبت دور کمر به دور بسن محاسبه شد. اندازه‌گیری دور کمر و دور بسن با استفاده از یک متر نواری و بدون تحمل هرگونه فشاری به بدن فرد با دقیق ۱ سانتی‌متر انجام شد. به منظور حذف خطای فردی همه اندازه‌گیری‌ها در هر جنس توسط یک نفر انجام شد. ارزیابی فعالیت فیزیکی (فعالیت‌های جسمانی غیر از فعالیت‌های روزمره که به طور منظم انجام می‌شود مثل پیاده‌روی، شنا و غیره) از افراد مورد مطالعه بر مبنای پاسخ‌گویی شفاهی انجام شد و افراد مورد مطالعه به سه قسمت فاقد فعالیت، فعالیت کمتر یا معادل ۳ سانت در هفت‌هه و بیشتر از ۳ سانت در هفته طبقه‌بندی شدند.

نمونه‌ی خون سیاهرگی پس از ۱۲ ساعت ناشتا بودن برای اندازه‌گیری سطح گلوکز خون و لیپیدهای سرم جمع‌آوری شد. آزمون تحمل گلوکز خوراکی پس از مصرف ۷۵ گرم گلوکز انجام و قند خون ۲ ساعته اندازه‌گیری شد. قند خون با استفاده از گلوکز اکسیداز با کیت تجاری شرکت شیم‌آنزیم و دستگاه اتوآنالایزر اندازه‌گیری شد. تری‌گلیسرید و کلسترول سرم با استفاده از معرفهای آنژیماتیک شرکت HDL-C شیم‌آنزیم و با دستگاه اتوآنالایزر اندازه‌گیری شد. به روش مستقیم با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون و با دستگاه اتوآنالایزر اندازه‌گیری شد. سطح LDL-C خون با استفاده از فرمول فریدوالد محاسبه شد. ضریب درون‌سنجدی و برون‌سنجدی متغیرها به ترتیب ۰/۰/۲ و ۰/۰/۱ و ۰/۰/۱ برای تری‌گلیسرید و ۰/۰/۱ برای کلسترول محاسبه شد.

دیابت قندی به صورت FBS \geq ۱۲۶ mg/dL یا ۲h-PG \geq ۲۰۰ mg/dL تعریف شد. داشتن دور کمر بالا در زنان به صورت دور کمر معادل یا بیشتر از ۸۸ سانتی‌متر و در مردان بیشتر یا معادل ۱۰۲ سانتی‌متر تعریف شد. سطح تری‌گلیسرید (TG) بالای سرم در هر دو جنس معادل و بیشتر از ۱۵۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر در نظر گرفته شد. افراد مورد مطالعه به تفکیک جنس در ۴ گروه طبقه‌بندی شدند.

۱- افرادی که دارای دور کمر طبیعی و TG طبیعی بودندⁱ(NWNT).

۲- افرادی که دارای دور کمر بالا و TG طبیعی بودندⁱⁱ(EWNT)

i- NWNT: Normal Waist Circumference and Normal Triglyceride
ii- EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride

ii- EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride
iii- NWET: Normal Waist Circumference and Elevated Triglyceride
iv- EWET: Enlarged Waist Circumference and Elevated Triglyceride
v - General Linear Model

فنتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم تفاوت آماری معنی‌داری نداشت ($P = 0.02$).

مشخصات عمومی زنان مورد مطالعه به تفکیک

فنتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم در جدول ۲ آمده است.

فنتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم مشاهده نشد. افرادی که دارای فنتیپ دور کمر هیپرتری‌گلیسریدمیک بودند نمایه‌ی توده‌ی بدن، دور کمر و نسبت دور کمر به باسن بیشتری در مقایسه با سایر گروهها داشتند ($0.001 < P$ برای همه). توزیع افراد از نظر فعالیت فیزیکی در

جدول ۱- ویژگی‌های عمومی مردان مورد مطالعه در فنتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم*

فنتیپ‌های دور کمر و تری‌گلیسرید سرم				
مقدار P	¶EWET	§NWET	‡EWNT	†NWNT
	۴۴	۱۴۳	۲۱	۱۲۴
۰/۵	۴۴/۴±۵/۸	۴۲/۹±۶/۲	۴۲/۳±۵/۳	۴۲/۷±۶/۶
< ۰/۰۰۱	††۲۱/۴±۲/۶	۲۶/۹±۲/۵	۳۲±۲/۹	۲۶/۱±۳
< ۰/۰۰۱	††۱۰/۵±۴/۴	۹۲/۴±۶/۷	۱۰/۷/۲±۴	۹۰±۷/۲
< ۰/۰۰۱	††۰/۹۴±۰/۰۳	۰/۹±۰/۰۶	۰/۹۴±۰/۰۳	۰/۸۸±۰/۰۵
۰/۲				
	۶۸/۳	۶۳/۳	۶۱/۹	۵۳/۴
۱۹/۵		۲۵/۲	۱۴/۳	۲۵/۰
۱۲/۲		۱۱/۵	۲۲/۸	۲۱/۶

* اعداد ارایه شده میانگین ± انحراف معیار هستند.

† NWNT: Normal Waist Circumference and Normal Triglyceride; ‡ EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride; § NWET: Normal Waist Circumference and Elevated Triglyceride; ¶ EWET: Enlarged Waist Circumference and Elevated Triglyceride

** مقادیر P با استفاده از آزمون آنوا برای متغیرهای کمی و با استفاده از مجذور خی برای متغیرهای کیفی حاصل شده‌اند: $\dagger\dagger < 0.001$ در مقایسه با NWNT و NWNT

جدول ۲- ویژگی‌های عمومی زنان مورد مطالعه در فنتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم*

فنتیپ‌های دور کمر و تری‌گلیسرید سرم				
مقدار P	¶EWET	§NWET	‡EWNT	†NWNT
	۲۵۰	۱۷۶	۲۰۶	۲۵۹
< ۰/۰۰۱	۴۳/۸±۶/۱	۴۲/۸±۶/۶	۴۳/۱±۶/۶	††۴۱/۷±۵/۹
< ۰/۰۰۱	††۲۲±۴/۱	۲۷/۱±۲/۲	۳۲/۱±۳/۷	۲۶/۵±۲/۹
< ۰/۰۰۱	††۹/۶/۱±۶/۹	۸۲±۲/۹	۹۵/۴±۵/۹	۸۰/۴±۵/۱
< ۰/۰۰۱	††۰/۹۴±۰/۰۳	۰/۹±۰/۰۶	۰/۹۴±۰/۰۳	۰/۸۸±۰/۰۵
۰/۵				
	۶۶/۷	۶۵/۱	۵۹/۹	۶۲/۶
۱۸/۵		۲۰/۱	۲۲/۹	۲۴
۱۴/۸		۱۴/۸	۱۵/۷	۱۲/۴

* اعداد ارایه شده میانگین ± انحراف معیار هستند.

† NWNT: Normal Waist Circumference and Normal Triglyceride; ‡ EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride; § NWET: Normal Waist Circumference and Elevated Triglyceride; ¶ EWET: Enlarged Waist Circumference and Elevated Triglyceride

** مقادیر P با استفاده از آنوا برای متغیرهای کمی و با استفاده از مجذور خی برای متغیرهای کیفی حاصل شده‌اند: $\dagger\dagger < 0.05$ در مقایسه با سایر گروهها؛ $\parallel < 0.001$ در مقایسه با NWNT و NWET

و تری گلیسرید سرم تفاوت آماری معنی‌داری نداشت ($P=0.5$). بین مردان مبتلا به فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک میانگین‌های خام سطح، تری گلیسرید، کلسترول سرم و فشارخون سیستولی و دیاستولی به‌طور معنی‌داری بیشتر و سطح HDL-C کمتر از بقیه‌ی گروهها بود ($P<0.01$) (جدول ۳).

افرادی که دارای فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک بودند، سن و نسبت دور کمر به باسن بیشتری در مقایسه با سایر گروهها داشتند ($P<0.05$). افراد دارای این فنوتیپ، نمایه‌ی توده‌ی بدن و دور کمر بالاتری در مقایسه با گروههای NWNT و NWET داشتند ($P<0.001$). توزیع افراد از نظر فعالیت فیزیکی بین فنوتیپ‌های مختلف دور کمر

جدول ۳- میانگین و انحراف معیارهای تعديل شده متغیرهای مختلف دور کمر و تری گلیسرید سرم در مردان*

مقدار P	فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری گلیسرید سرم			
	¶ EWET (n = ۴۳)	§ NWET (n = ۱۴۳)	‡ EWNT (n = ۲۱)	† NWNT (n = ۱۲۴)
	فند خون ناشتا (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)			
0/2	۱۱۱/۷ ± ۴۴/۵	۱۱۰/۳ ± ۵۱	۱۰۲/۳ ± ۱۶/۱	۱۰۰/۷ ± ۲۳/۷
0/0.86	۱۰۶/۳ ± ۷	۱۱۰/۶ ± ۲/۵	۹۸/۷ ± ۹/۵	۱۰۱/۱ ± ۴**۲
0/0.65	۱۴۱/۵ ± ۷۲/۲	۱۱۸ ± ۶۵/۳	۱۲۱/۶ ± ۲۲	۱۱۰/۶ ± ۵۹/۵
< 0/0.1	۱۲۲/۱ ± ۱۰/۳	۱۱۷/۳ ± ۵/۲	۱۱۲/۵ ± ۱۲/۷	۱۰۹/۸ ± ۶۲
0/0.62	۵/۵ ± ۱/۷	۵/۲۷ ± ۱/۵	۵/۵ ± ۱/۲	۴/۹ ± ۰/۸۸
0/0.1	۵/۲ ± ۰/۲۶	۵/۳ ± ۰/۱۲	۵/۴ ± ۰/۳۱	۴/۹۸ ± ۰/۱۴۲
< 0/0.01	۲۹۵/۴ ± ۱۴۸	۲۳۹/۴ ± ۹۳/۷	۱۱۱/۱ ± ۲۶/۳	۱۱۱/۷ ± ۲۵/۱
< 0/0.01	۳۰۰/۶ ± ۱۵	۲۲۸/۸ ± ۷/۵	۱۱۶/۱ ± ۲۰/۴	۱۰۹/۶ ± ۸/۷۲
< 0/0.1	۳۹/۴ ± ۹/۴	۴۲/۳ ± ۱۱	۴۳/۹ ± ۸/۶	۴۶ ± ۱۲/۳
0/0.57	۴۰/۰ ± ۲	۴۲/۲ ± ۱	۴۴/۹ ± ۲/۷	۴۵/۵ ± ۱/۱۲
< 0/0.01	۲۱۲/۷ ± ۴۸	۲۰/۵/۷ ± ۳۶/۲	۱۸۷/۶ ± ۲۹/۱	۱۸۵/۲ ± ۳۷/۳
< 0/0.01	۲۰۸/۸ ± ۶/۸	۲۰/۷/۳ ± ۲/۴	۱۸۲/۵ ± ۹/۲	۱۸۶/۱ ± ۲/۹۲
0/0.969	۱۱۹/۸ ± ۴۵	۱۱۹ ± ۲۹/۴	۱۲۱/۵ ± ۲۵/۲	۱۱۷/۹ ± ۳۱/۶
0/157	۱۱۲/۷ ± ۶/۵	۱۲۰/۴ ± ۳	۱۱۵/۲ ± ۷/۸	۱۱۹/۸ ± ۲/۳۲
< 0/0.01	۱۱۴/۶ ± ۱۶/۷	۱۱۵/۴ ± ۱۷/۴	۱۲۱ ± ۲۰/۳	۱۱۰ ± ۱۵
< 0/0.01	۱۱۶ ± ۲/۳	۱۱۶ ± ۱/۴	۱۱۷ ± ۳/۹	۱۱۱/۴ ± ۱/۷۲
< 0/0.01	۸۱/۳ ± ۱۱/۱	۷۳/۴ ± ۱۲/۲	۷۸/۲ ± ۱۵/۹	۶۹/۵ ± ۱۱/۴
< 0/0.01	۸۰/۴ ± ۲/۲	۷۴ ± ۱/۱	۷۶/۴ ± ۲/۹	۶۹/۹ ± ۱/۲۲

* مقادیر ارایه شده برای مدل خام میانگین ± انحراف معیار و در مدل‌های تعديل شده میانگین ± خطای معیار هستند؛

† NWNT: Normal Waist Circumference and Normal Triglyceride; ‡ EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride; § NWET: Normal Waist Circumference and Elevated Triglyceride; ¶ EWET: Enlarged Waist Circumference and Elevated Triglyceride

|| مقادیر P برای مدل خام از آزمون آنوا و در مدل‌های تعديل شده از ANCOVA (Bonferroni correctin) به دست آمدند؛ ** در این مدل

علاوه بر اثر سن و فعالیت فیزیکی، BMI نیز تعديل شده است.

میانگین‌های خام و تعدیل شده‌ی متغیرهای متابولیک در زنان مبتلا به فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و هیپرتری گلیسریدمیک به طور معنی‌داری بیشتر از بقیه‌ی گروهها بود ($P < 0.001$ برای همه) (جدول ۴). این تفاوت‌های معنی‌دار پس از تعدیل اثر سن و فعالیت فیزیکی ($P < 0.001$) برای همه متغیرهای متابولیک و حتی پس از تعدیل اثر BMI همچنان مشاهده شد ($P < 0.01$ برای همه متغیرهای متابولیک).

چنین تفاوت معنی‌داری پس از تعدیل اثر سن و فعالیت فیزیکی نیز همچنان در این متغیرها مشاهده شد. علاوه بر آن، در قندخون دو ساعته بعد و HbA_{1c} هم پس از تعدیل اثر سن و فعالیت فیزیکی، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد ($P < 0.01$). در مدل نهایی که اثر BMI نیز تعدیل شد، تمام تفاوت‌های معنی‌دار همچنان مشاهده شد به استثنای سطح HDL-C سرم که به طور حاشیه‌ای معنی‌دار بود ($P = 0.057$).

جدول ۴- میانگین و خطاهای معیار تعدیل شده‌ی متغیرهای متابولیک در فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم در زنان

مقدار $\ddagger P$	فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری‌گلیسرید سرم				فند خون ناشتا (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
	§EWET (n = ۲۵۰)	‡NWET (n = ۱۷۶)	†EWNT (n = ۲۰۶)	*NWNT (n = ۲۵۹)	
< 0.001	۱۰۵±۳۱/۲	۹۸±۲۶/۲	۱۰۲/۹±۲۴/۲	۹۵/۷±۱۶/۹	مقدار خام
< 0.001	۱۰۴/۷±۱/۸	۹۸/۱±۲	۱۰۳±۲	۹۵/۸±۱/۵ **	مدل
< 0.001	۱۲۸±۵۴	۱۲۲/۱±۴۱	۱۳۴/۴±۴۵	۱۱۸/۴±۲۶/۱	مقدار خام
< 0.001	۱۳۷/۴±۳/۲	۱۲۲±۲/۷	۱۲۴/۴±۳/۶	۱۱۸±۲/۹ ۲	مدل
< 0.001	۵/۳ ± ۱	۴/۹ ± ۱/۱	۵/۱±۱	۴/۸ ± ۰/۷	مقدار خام
< 0.001	۵/۳ ± ۰/۰۷	۴/۹ ± ۰/۰۸	۵/۱ ± ۰/۰۸	۴/۸ ± ۰/۰۶ ۲	مدل
< 0.001	۲۲۲/۸±۸۹	۲۱۸/۸±۸۰/۸	۱۰۸/۲±۲۴/۸	۱۰۳/۲±۲۶/۱	مقدار خام
< 0.001	۲۲۶/۸±۴/۲	۲۲۱/۸±۴/۹	۱۰۶/۴±۴/۷	۱۰۵/۵±۳/۷ ۲	مدل
< 0.001	۴۵/۲±۱۲/۱	۴۶±۱۱	۴۹/۵±۱۱/۲	۵۰/۱±۱۱/۸	مقدار خام
< 0.001	۴۴/۶ ± ۰/۸	۴۶/۶ ± ۱	۴۸/۸ ± ۰/۹	۵۰/۷±۰/۷ ۲	مدل
< 0.001	۲۱۲/۷±۳۹/۲	۲۰۰/۸±۳۹/۲	۱۹۴/۸±۲۶/۴	۱۸۶/۵±۲۶/۲	مقدار خام
< 0.001	۲۱۰/۷ ± ۲/۷	۲۰۱/۳±۳/۱	۱۹۴/۵±۳	۱۸۸/۹ ± ۲/۴ ۲	مدل
< 0.001	۱۲۵/۴±۳۲/۸	۱۱۲/۵±۳۰/۶	۱۲۴/۹±۳۲	۱۱۶/۴±۳۱/۱	مقدار خام
< 0.001	۱۲۳/۸±۲/۵	۱۱۲/۳±۲/۹	۱۲۴/۹±۲/۷	۱۱۸/۳±۲/۱ ۲	مدل
< 0.001	۱۱۸/۳±۱۶	۱۱۱/۵±۱۴/۸	۱۱۴/۲±۱۶	۱۰۶/۴±۱۵	مقدار خام
< 0.001	۱۱۶±۱/۱	۱۱۲/۴±۱/۳	۱۱۲/۶±۱/۳	۱۰۸/۱ ± ۱ ۲	مدل
< 0.001	۷۶/۱±۱۲/۵	۷۱/۵±۱۱/۸	۷۴/۲±۱۱/۷	۶۶/۶±۱۱/۸	مقدار خام
< 0.001	۷۴/۹ ± ۰/۹	۷۲ ± ۱	۷۳ ± ۱	۶۷/۶±۰/۷ ۲	مدل

* NWNT: Normal Waist Circumference and Normal Triglyceride; † EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride; ‡ NWET: Normal Waist Circumference and Elevated Triglyceride; § EWET: Enlarged Waist Circumference and Elevated Triglyceride

¶ مقادیر P برای مدل خام از آنوا و در مدل‌های تعدیل شده از ANCOVA (به دست آمداند؛ * در این مدل علاوه بر اثر سن و فعالیت فیزیکی، BMI نیز تعدیل شده است.

معنی داری از گروههای دیگر بالاتر بود ($P < 0.01$) برای هر دو جنس). شیوع اختلال تحمل گلوکز در مردان و زنان بین فنوتیپ‌های مختلف تفاوت آماری معنی داری نداشت.

شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکز در فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری گلیسرید سرم به تفکیک جنس در جدول ۵ آمده است. شیوع دیابت هم در مردان و هم در زنان مبتلا به فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک به طور

جدول ۵- شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکز به تفکیک جنس در فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری گلیسرید سرم

¶P مقدار	فنوتیپ‌های مختلف دور کمر و تری گلیسرید سرم				مردان (درصد)
	§EWET	‡NWET	†EWNT	*NWNT	
۰/۰۶	۹/۶	۴۷/۴	۴/۵	۲۸/۵	سالم
۰/۷	۱۷/۸	۴۰	۸/۹	۳۲/۲	
۰/۱	۱۲/۳	۳۴/۲	۱۱	۴۲/۵	
< ۰/۰۱	۳۰/۳	۴۸/۵	۳	۱۸/۲	
زنان (درصد)					
< ۰/۰۰۱	۲۱/۵	۱۹/۱	۱۸/۲	۴۱/۲	سالم
۰/۱	۲۸/۱	۱۵/۲	۲۶/۴	۳۰/۲	IGT
۰/۹	۲۷/۳	۱۶/۵	۲۲/۲	۳۴/۱	IFG
< ۰/۰۰۱	۴۴/۹	۱۶/۷	۲۲/۱	۱۵/۴	دیابتی

* NWNT: Normal Waist Circumference and Normal Triglyceride; † EWNT: Enlarged Waist Circumference and Normal Triglyceride; ‡ NWET: Normal Waist Circumference and Elevated Triglyceride; § EWET: Enlarged Waist Circumference and Elevated Triglyceride

¶ مقدار P از آزمون مجنور خی حاصل شده است؛ || قند خون دو ساعت بعد ≤ ۲۰۰ mg/dL: IGT؛ ** قند ناشتا ≤ ۱۲۵ mg/dL: IFG؛ *** قند ناشتا ≤ ۱۴۰ mg/dL: آزمایش دو ساعت بعد دو ≥ ۲۰۰ mg/dL: دیابت.

** دیابت: قند ناشتا ≥ ۱۲۶ mg/dL در دو آزمایش و یا قند خون بعد دو ساعت بعد ≥ ۲۰۰ mg/dL در دو آزمایش جداگانه.

فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک به عنوان یکی از ابزارهای ساده برای غربالگری عوامل خطرزای متابولیک پیشنهاد شده است.^{۲۰} با توجه به افزایش سریع بیماری‌های قلبی و دیابت نیاز به گسترش ابزارهای ساده و ارزان برای غربالگری وجود دارد تا بتوان بهبودی در وضعیت سلامتی ایجاد کرد.^{۲۱} مطالعه‌های مختلف نشان داده‌اند که افراد مبتلا به این فنوتیپ دارای تجمع بیشتری از عوامل خطرزای متابولیک هستند.^{۲۲} این فنوتیپ تاکنون برای شناسایی خطر بیماری‌های قلبی و تریاد متابولیک استفاده شده است.^{۲۳} در مطالعه‌های انجام شده در تهران مشاهده شد که این فنوتیپ قادر به شناسایی بیماری‌های قلبی نه تنها در افراد بزرگسال^{۱۸,۱۹} بلکه در کودکان و نوجوانان^{۲۴} نیز هست. به طوری که نوجوانان مبتلا به این فنوتیپ دارای شیوع بالای عوامل خطرزای متابولیک بودند. این فنوتیپ می‌تواند روشی

بحث

یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که ارتباط مثبتی بین فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک و شیوع دیابت وجود دارد. همچنین مشاهده شد که مردان مبتلا به این فنوتیپ دارای سطح تری گلیسرید، کلسترول، فشار خون سیستولی و دیاستولی بالا و HDL-C پایین نسبت به سایر گروهها هستند. در زنان مبتلا به این فنوتیپ، قندخون، HbA_{1c}، LDL-C، کلسترول، فشار خون سیستولی و دیاستولی نسبت به سایر گروهها بالاتر و HDL-C پایین‌تر بود. بر اساس داشت ما بررسی حاضر اولین مطالعه‌ای است که در آن ارتباط این فنوتیپ با شیوع دیابت و IGT در افراد با سابقه فامیلی دیابت بررسی شده است.

مرزی متفاوت برای دور کمر و سطح تری‌گلیسرید سرم در مطالعه‌های مختلف است. همچنین افراد بررسی شده در مطالعه‌های مختلف دارای محدوده‌ی سنی مختلفی هستند به طور مثال مطالعه‌ی قند و لیپید تهران شیوع این فنوتیپ را بیشتر از مطالعه‌ی حاضر گزارش کرده است که شاید دلیل آن حدود مرزی و محدوده‌ی سنی متفاوت افراد شرکت کننده در این دو مطالعه باشد. در مطالعه‌ی حاضر شیوع فنوتیپ EWET در مردان دیابتی $30/3$ درصد و در زنان $44/9$ درصد بود این در حالی است که $18/2$ درصد مردان دیابتی و $15/4$ درصد زنان دیابتی دارای دور کمر و سطح تری‌گلیسرید سرم طبیعی بودند. شیوع این فنوتیپ در مردان چهار اختلال تحمل گلوکز (IGT)ⁱ $17/8$ درصد و در زنان $15/2$ درصد بود و فقط $22/3$ درصد مردان و $20/3$ درصد زنان مبتلا به اختلال تحمل گلوکز دارای فنوتیپ NWNT بودند. شیوع فنوتیپ EWET در چهار IFGⁱⁱ $12/3$ درصد و در زنان $27/3$ درصد بود. استیپیر و همکارانⁱⁱⁱ فنوتیپ EWET را به عنوان یک مشخص کننده‌ی تریاد متابولیک معرفی کردند که پیشگویی کننده بیماری‌های قلبی در بیماران دیابتی و افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز است. این مطالعه که در 1190 نفر انجام شد، بیش از 5.3% مردان و نزدیک به 8.0% زنان مبتلا به این فنوتیپ، دیابت و یا اختلال تحمل گلوکز داشتند. در مطالعه‌ی هنری و همکاران^{iv} که در جمعیت $40-74$ ساله‌ی آمریکایی انجام شد، $25/4$ درصد افراد دارای این فنوتیپ، دیابت داشتند و تنها 8 درصد افراد بدون این فنوتیپ مبتلا به بیماری دیابت بودند.^v با توجه به مطالعه‌ی حاضر و مطالعه‌های قبلی، شیوع این فنوتیپ در افراد دیابتی و چهار اختلال تحمل گلوکز بالاتر است. بنابراین تصور می‌شود که ارتباطی بین این فنوتیپ با شیوع اختلال‌های قند خون وجود داشته باشد. گفته می‌شود افزایش دور کمر با افزایش چربی‌های داخل شکمی همراه است که این امر باعث افزایش تولید چربی در کبد و افزایش سطح LDL-C و VLDL می‌شود، همچنین گلوکونثوژنز کبدی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش چربی‌های داخل شکمی باعث افزایش اسیدهای چرب آزاد می‌شود که می‌تواند باعث ایجاد مقاومت به انسولین شده، اختلال‌های مربوط به قند خون را به وجود بیاورد.^{vi} بیان ژنی پروتئین Fat/CD36 که حامل اسیدهای چرب طولانی زنجیر است با انسولین تنظیم

i - Impaired Glucose Tolerance
ii - Impaired Fasting Glucose

ساده برای شناسایی زودتر افراد در معرض خطر دیابت نیز باشد.^{vii} مطالعه‌های محدودی درباره‌ی این فنوتیپ و ارتباط آن با بیماری دیابت و اختلال تحمل گلوکز انجام شده است. فقدان چنین مطالعه‌ای به ویژه زمانی خودنمایی می‌کند که چنین ارتباطی را در افراد با سابقه‌ی فامیلی دیابت بررسی کنیم. یافته‌های این مطالعه نشان داد که شیوع این فنوتیپ در گروه دیابتی‌ها و افراد دارای اختلال تحمل گلوکز بالاتر بود. بنابراین استفاده از چنین شاخص ساده‌ای در این افراد می‌تواند برای شناسایی زودرس آنها کمک شایانی به سیستم بهداشتی نماید.

یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که شیوع عوامل خطرزای متابولیک در افراد دارای این فنوتیپ بیشتر از سایر گروهها بود. میزان شیوع دیابت و IGT و همچنین شاخص‌های مربوط به کنترل گلیسمیک در افراد دارای این فنوتیپ به طور معنی‌داری بیشتر از سایر گروهها بود. هرچند چنین یافته‌هایی در مطالعه‌های پیشین گزارش شده است، جمعیت مورد مطالعه در بررسی‌های قبلی، افراد با سابقه فامیلی دیابت نبودند. شیوع این فنوتیپ در مطالعه‌ی حاضر در مردان $9/6$ درصد و در زنان $22/6$ درصد بود. لومیو و همکاران^{viii} در مطالعه قلب کوبک روی 907 مرد، شیوع فنوتیپ EWET را 19 درصد گزارش کردند. در تحقیقی که زرنیکوف و همکاران^{ix} روی 2430 مرد در فرانسه انجام دادند، شیوع این فنوتیپ $12/1$ درصد بود. در مطالعه‌ی سامنر و همکاران^x شیوع این فنوتیپ در زنان یائسه سیاهپوست 21 درصد، در زنان سفیدپوست $28/3$ درصد و در مکزیکی‌ها $42/3$ درصد بود. صولتی و همکاران در مطالعه‌ی قند و لیپید تهران شیوع این فنوتیپ را در مردان $18/70$ ساله 19 درصد^{xii} و در زنان، $21/9$ درصد^{xiii} گزارش کردند. در مطالعه‌ی توسلی و همکاران^{xv} شیوع این فنوتیپ در زنان بالای 19 ساله اصفهانی، 24% بود. در مطالعه‌ی کلیشادی و همکاران شیوع این فنوتیپ در دانشآموزان $8/52$ آموزان بود.^{xvi} یافته‌هایی به دست آمده نشان می‌دهد شیوع این فنوتیپ در جمعیت‌های مختلف متفاوت است. شاید یکی از دلایل آن نژاد باشد. به طوری که تصور می‌شود در افراد ساکن خاورمیانه نوع خاصی از چاقی با عنوان الگوی خاورمیانه‌ای چاقی حاکم است که از مشخصه‌های بارز این نوع خاص چاقی، تجمع بیشتر چربی در ناحیه شکم است. همچنین در این الگوی خاص چاقی شیوع چاقی شکمی در زنان بیشتر از مردان است.^{xvii} دلایل دیگر، استفاده از حدود

اندازه‌گیری توسط خود فرد را نیز به او می‌دهد. ضمن این که مطالعه‌های پیشین نشان داده‌اند که دور کمر اندازه‌گیری شده در باریکترین ناحیه‌ی کمر ارتباط معقول و منطقی با عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی - عروقی دارد. اگر در این مطالعه سطح انسولین و حساسیت بافت‌ها اندازه‌گیری شده بود، می‌توانست به تحلیل یافته‌های فوق کمک بیشتری کند.

این مطالعه دارای نقاط قوت زیر است:

- ۱) انجام مطالعه در جمعیت با سابقه‌ی فامیلی دیابت که برای اولین بار است انجام می‌شود.
- ۲) استفاده از حجم نمونه‌ی زیاد برای نشان دادن چنین ارتباطی در این افراد
- ۳) در نظر گرفتن هر دو جنس در این مطالعه که نسبت به مطالعه‌های پیشین داده‌های بیشتری را به داشت ما اضافه می‌کند.
- ۴) کنترل عوامل مخدوشگر و شناسایی یک ارتباط مستقل

سپاسگزاری: از همکاری کارکنان محترم مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم اصفهان خانم‌ها مهری فروغی‌فر، زهرا خانی و آقای مجید آبیار قدردانی می‌شود.

می‌شود. تخریب این پروتئین با شدت مقاومت به انسولین ارتباط دارد.^{۲۴} همچنین فعالیت هورمون LPL که تنظیم‌کننده‌ی کلیدی سطح تری‌گلیسرید سرم است، در افراد دارای مقاومت به انسولین مختل شده و باعث افزایش سطح تری‌گلیسرید می‌شود.^{۲۵} از طرف دیگر دیده شده است که طولانی شدن زمان وجود اسیدهای چرب آزاد در سلول‌های بتا پانکراس ترشح انسولین را کم می‌کند که این امر همراه با افزایش خطر دیابت است.^{۲۶}

در تفسیر یافته‌های مطالعه‌ی حاضر باید به برخی محدودیت‌ها توجه نمود. محدودیت اصلی این مطالعه ماهیت مقطعی آن است که به ما اجازه‌ی نتیجه‌گیری‌های علت و معلولی را نمی‌دهد. از محدودیت‌های دیگر می‌توان به استفاده از حدود مرزی مختلف برای تعریف فنوتیپ دور کمر هیپرتری‌گلیسریدمیک اشاره کرد. استفاده از باریکترین نقطه‌ی دور کمر در اندازه‌گیری دور کمر و فقدان یک محل استاندارد برای اندازگیری دور کمر نیز باید در تحلیل یافته‌های مطالعه‌ی حاضر مدنظر قرار گیرد. هرچند که در زمینه‌ی محل اندازه‌گیری دور کمر بین پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد، اعتقاد بر این است که استفاده از باریکترین نقطه‌ی دور کمر از سهولت بالایی برای اندازه‌گیری برخوردار است و علاوه بر کاربرد بالینی، اجازه‌ی

References

1. Qiao Q, Hu G, Tuomilehto J, Nakagami T, Balkau B, Borch-Johnsen K, et al. Age- and sex-specific prevalence of diabetes and impaired glucose regulation in 11 Asian cohorts. *Diabetes Care*. 2003; 26: 1770-80.
2. Zandbergen AA, Sijbrands EJ, Lamberts SW, Bootsma AH. Normotensive women with type 2 diabetes and microalbuminuria are at high risk for macrovascular disease. *Diabetes Care*. 2006; 29: 1851-5.
3. King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025. *Diabetes Care* 1998; 21: 1414-31.
4. Amini M, Afshin-Nia F, Bashardoust N, Aminrooya A, Shahparian M, Kazemi M. Prevalence and risk factors of diabetes mellitus in the Isfahan city population (aged 40 or over) in 1993. *Diabetes Res Clin Pract* 1997; 38: 185-90.
5. Azizi F, Saadat N, Salehi P, Emami H. Glucose intolerance and cardiovascular risk factors in Tehran urban population: "Tehran Lipid and Glucose Study". *Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism* 2002; 3: 247-56.
6. Larijani B, Zahedi F. Epidemiology of diabetes in Iran. *Iranian Journal of Diabetes & Lipid Disorders* 2002; 1: 1-9.
7. Najafipour F, Azizi F, Zareizadeh M. Epidemiological study of familial type 2 diabetes in Tehran. *Iranian Journal of Diabetes & Lipid Disorders* 2004; 4: 35-42.
8. Asghar S, Hussain A, Ali SM, Khan AK, Magnusson A. Prevalence of depression and diabetes: a population-based study from rural Bangladesh. *Diabet Med* 2007; 24: 872-7.
9. St-Pierre J, Lemieux I, Perron P, Brisson D, Santuré M, Vohl MC, et al. Relation of the "hypertriglyceridemic waist" phenotype to earlier manifestations of coronary artery disease in patients with glucose intolerance and type 2 diabetes mellitus. *Am J Cardiol* 2007; 99: 369-73.
10. Mirmiran P, Azizi F. Obesity. In: Azizi F, Janghorbani M, Hatami H, editors. *Epidemiology and control of noncommunicable diseases in Iran*. 2nd ed. Tehran: Eshtiagh Pub; 2000. p. 56-63.
11. Misra A, Wasir JS, Vikram NK. Waist circumference criteria for the diagnosis of abdominal obesity are not applicable uniformly to all populations and ethnic groups. *Nutrition* 2005; 21: 969-76.
12. Kahn HS. The "lipid accumulation product" performs better than the body mass index for recognizing cardiovascular risk: a population-based comparison. *BMC Cardiovasc Disord* 2005; 5: 26.
13. Esmailzadeh A, Mirmiran P, Azizi F. Waist-to-hip ratio is a better screening measure for cardiovascular risk factors than other anthropometric indicators in Iranian adult men. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2004; 28: 1325-32.
14. Ho SC, Chen YM, Woo JL, Leung SS, Lam TH, Janus ED. Association between simple anthropometric

Original Article

Relationship Between Hypertriglyceridemic Waist Phenotype with Metabolic Disorders in Individuals with Family History of Diabetes

Zare M¹, Esmaillzadeh A², Sadeghi M¹, Azadbakht L², Mehvarifar N¹, Amini M¹,
Amini M¹.

¹ Endocrine & Metabolism Research Center, ² Department of Nutrition, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, I.R.Iran
e-mail: mehr_mzare@yahoo.com

Abstract:

Introduction: Recent studies have used antropometric measures along with biochemical indicators as screening tools for chronic diseases. Few studies have assessed the relation of Enlarged Waist Elevated Triglyceridemic (EWET) phenotype with diabetes, particularly among individuals with family history of diabetes. This study aimed to evaluate the association of the EWET phenotype with diabetes among individuals with family history of diabetes. **Material and Methods:** Antropometric and biochemical measurments were assessed in a pouplation-sbased cross-sectional study of 332 male and 991 female Isfahani adults, aged 35-55 years. The EWET phenotype was defined as serum trigcylglycerol concentrations ≥ 150 mg/dl and concurrent waist circumference ≥ 88 cm in women and ≥ 102 cm in men. **Results:** The prevalence of the EWET phenotype was 9.6% among men and 23.6% among women. Individuals with the phenotype had significantly higher antropometric measurements as compared to other groups. After control for age and physical activity, men with the EWET phenotype were significantly more likely to have high serum cholestrol ($P<0.001$), systolic BP ($P<0.01$) and diastolic BP ($P<0.001$). Even after additonal control for BMI the significant associations remained except for low HDL Cholestrol women with the EWET phenotype, who had significantly adverse metabolic risks as compared to other phenotypes, both before or after control for BMI ($P<0.001$). Individuals with the EWET phenotype were more likely to have diabetes (both genders) and IGT (women only). **Conclusion:** Our findings showed a significant association between the EWET phenotype and diabetes. This phenotype could be used for early identification of diabetes and IGT.

Key words: Hypertriglyceridemic waist, Diabetes, Family history, Cardiovascular disease, Antropometry, impaired glucose tolerance test