

بروتکل تزریق انسولین

گرد آورنده:

پهنتاز رئیسی

کارشناس پرستاری و مسئول واحد آموزش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

بروتکل تزریق انسولین NPH

وسایل مورد نیاز جهت تزریق را آماده کنید.
دست های خود را با آب و صابون بشویید و خشک کنید.

نگهداری و بال انسولین:

- تاریخ مصرف و نوع انسولین را جذک کنید.
- انسولین باید به صورت یکنواخت بوده و ذرات معلق و کریستال نداشته باشد.
- چنانچه و بال انسولین جهت ذخیره تهیه شده است در یخچال نگذاری می شود.
- و بال انسولین در حال استفاده بیرون از یخچال و دمای ۲۵-۸ درجه سانتی گراد دور از نور خورشید نگهداری می شود.
- از تزریق انسولین سرد خودداری شود.

* چنانچه انسولین سرد تزریق شود می تواند باعث دردناک شدن تزریق و کاهش سرعت جذب آن شود.

• پس از باز شدن دربوش، و بال انسولین ۳۰-۲۸ روز قابل استفاده است و بعد از این مدت چنانچه هنوز انسولین داخل و بال باقی مانده است قابل مصرف نمی باشد.

سرنگ انسولین:

* سرنگ انسولین در مقیاسهای ۳۰ و ۱۰۰ واحدی موجود می باشد.

* توجه داشته باشید نحوه تقسیم بندی دوز در سرنگهای ۱۰۰ واحدی با سرنگهای ۳۰ و ۵۰ واحدی متفاوت می باشد.


با در نظر داشتن شرایط زیر می توان یک سرنگ انسولین را چندین مرتبه استفاده کرد:

- نیدل به خون آغشته نشده باشد .
- نیدل تنها با یوست محل تزریق تماس داشته باشد.
- نیدل خمیده نشده است.
- نیدل تیز است و به راحتی وارد یوست می شود.
- از تماس دست با قسمت داخلی بیستون خودداری شود.

- بس از تزریق سرنگ چندین مرتبه پمپ می شود تا انسولین باقی مانده در آن کاملاً "تخلیه شود".
- دربوش سرنگ گذاشته شده و جنابجه مجدداً استفاده می شود داخل پخچال نگهداری می شود.
- * می توان از نصب ذره بین های مخصوص جهت بهتر دیده شدن خطوط سرنگ استفاده کرد.

روش کشیدن انسولین (NPH) داخل سرنگ:


- ویال را کف دست گذاشته و به آرامی بغلطایید.
- سرنگ را دقیقاً "به اندازه دوز انسولین مورد نیاز از هوا بر کنید.
- سرنگ را وارد ویال NPH کرده و هوای موجود در آن را داخل ویال خالی کنید.
- ویال را برگردانده و دوز انسولین مورد نظر را داخل سرنگ بکشید.
- در این مرحله جهت هواگیری میتوان مقدار دوز بیشتری کشیده با جند ضربه حباب هوا را به سمت نیدل هدایت کرد و سپس مقدار دوز انسولین را در داخل ویال تنظیم کرد.



روش و محل تزریق انسولین:

- جهت تزریق می توان از دست ها، شکم، باسن و ران ها استفاده کرد.
- جنابجه یوست تمیز است نیازی به استفاده از الکل نمی باشد.
- * در صورتی که از الکل استفاده شد باید اجازه دهید کاملاً "خشک شود.
- * تزریقها باید با فاصله ۲ سانتی متر از هم انجام شود.

- * جهت پیشگیری از لبودیستروفی محلی که امروز تزریق شده است تا یک ماه آینده مجدداً تزریق انجام نگیرد.
- * بیشترین سرعت جذب انسولین به ترتیب در شکم، بازوها و ران ها می باشد.
- * با توجه به اینکه محل تزریق می تواند بر سرعت جذب انسولین تأثیر بگذارد بهتر است تزریقها را در یک زمان مشخص در یک محل انجام دهید.
- * زاویه نیدل در هنگام تزریق از ۴۰-۹۰ درجه می تواند متغیر باشد.
- * زاویه محل تزریق را با توجه به ضخامت بافت چربی محل تزریق در نظر بگیرد.
- * با توجه به اینکه تزریق به صورت زیر جلدی انجام می شود، نباید محل تزریق شده برآمده شود.
- * در صورت برآمده شدن محل تزریق عمق تزریق کم بوده و داخل جلدی بوده است.
- * جنانجه تجمع بافت چربی در قسمت شکم زیاد است بهتر است جهت تزریق استفاده نشود.
- * محل تزریق را به گونه ای جمع کنید که از عضله فاصله بگیرد.
- * نیدل را سریع وارد بوست کنید.
- * سرنگ را به آرامی تخلیه کنید.
- * پس از آنکه سرنگ کاملاً تخلیه شد ۱۰ ثانیه تأمل کنید.
- * نیدل را به صورت مستقیم و سریعاً خارج کنید.
- * از مالبس ، گرم و یا سرد کردن محل تزریق خودداری شود.



روش مخلوط کردن انسولینهای (NPH+Rgular) داخل سرنگ:

وسائل مورد تیار جهت تزریق را آماده کنید.

دست های خود را با آب و صابون بشویید و خشک کنید.

نگهداری و بالهای انسولین:

- تاریخ مصرف و نوع انسولین را چک کنید.
 - انسولین NPH باید به صورت یکنواخت بوده و ذرات معلق و کریستال نداشته باشد.
 - انسولین Rgular کاملاً شفاف باشد.
 - جنانجه و بال انسولین جهت ذخیره تهیه شده است در بخشال نگهداری می شود.
 - وبال انسولین در حال استفاده بپرون از بخشال و دمای ۲۵-۸ درجه سانتی گراد دور از نور خورشید نگهداری می شود.
 - از تزریق انسولین سرد خودداری شود.
- * جنانجه انسولین سرد تزریق شود می تواند باعث دردناک شدن تزریق و کاهش سرعت جذب آن شود.
- پس از باز شدن دریوش ، وبال انسولین ۳۰-۲۸ روز قابل استفاده است و بعد از این مدت جنانجه هنوز انسولین داخل وبال باقی مانده است قابل مصرف نمی باشد.

سرنگ انسولین:

- سرنگ انسولین در مقیاسهای ۵۰-۳۰ و ۱۰۰ واحدی موجود می باشد.
- * توجه داشته باشید نحوه تقسیم بندی دوز در سرنگهای ۱۰۰ واحدی با سرنگهای ۳۰ و ۵۰ واحدی متفاوت می باشد.

با در نظر داشتن شرایط زیر می توان یک سرنگ انسولین را چندین مرتبه استفاده کرد:


- نیدل به خون آغشته نشده باشد .
 - نیدل تنها با یوست محل تزریق تماس داشته باشد.
 - نیدل خمیده نشده است.
 - نیدل تیز است و به راحتی وارد یوست می شود.
 - از تماس دست با قسمت داخلی بیستون خودداری شود.
- پس از تزریق سرنگ چندین مرتبه پمپ می شود تا انسولین باقی مانده در آن کاملاً "تخلیه شود .
- دریوش سرنگ گذاشته شده و جنانجه مجدداً استفاده می شود داخل بخشال نگهداری می شود.

* می توان از نصب ذره بین های مخصوص جهت بهتر دیده شدن خطوط سرنگ استفاده کرد.

مراحل کشیدن انسولین :

* در نظر داشته باشید جهت جلوگیری از وارد شدن انسولین ویال NPH به داخل ویال Regular همیشه ابتداء انسولین Regular را بکشید.

- ویال NPH را کف دست خود گذاشته و به آرامی بغلطانید تا یکنواخت شود.
 - سرنگ را دقیقاً به اندازه دوز انسولین NPH مورد نیاز از هوا بر کنید.
 - در حالی که ویال انسولین به صورت عمودی روی میز قرار دارد هوای داخل سرنگ را داخل ویال خالی کرده و سرنگ را خارج کنید.
 - سرنگ را دقیقاً به اندازه دوز انسولین Regular از هوا بر کنید.
 - سرنگ را وارد ویال Regular کرده و هوای موجود در آن را داخل ویال تخلیه کنید.
- * میزان هوای مورد نیاز را برای هر ویال جداگانه داخل سرنگ کشیده و به آن تزریق می کنیم.
- دوز مورد نظر از انسولین Regular را کشیده و داخل ویال هوا گیری کنید.
 - سرنگ را خارج کرده ، وارد ویال NPH کنید.
 - انسولین NPH را به آرامی و دقیقاً به میزان مورد نظر بکشید.
- * چنانچه اشتباهات " مقدار انسولین NPH بیشتر از مقدار مورد نظر شد سرنگ را کاملاً " تخلیه کرده و تمام مراحل را از ابتداء انجام دهید.
- * انسولین مخلوط شده را بلافاصله و حداقل تا دو دقیقه بعد تزریق کنید.



روش و محلهای تزریق انسولین:

- جهت تزریق می‌توان از دست‌ها، شکم، باسن و ران‌ها استفاده کرد.
- چنانچه بوسیت تمیز است نیازی به استفاده از الکل نمی‌باشد.
- * در صورتی که از الکل استفاده شد باید اجازه دهید کاملاً "خشک" شود.
- * تزریقها باید با فاصله ۲ سانتی‌متر از هم انجام شود.
- * جهت پیشگیری از لبپودیستروفی محلی که امروز تزریق شده است تا يك ماه آینده مجدداً تزریق انجام نگیرد.
- * بیشترین سرعت جذب انسولین به ترتیب در شکم، باروها و ران‌ها می‌باشد.
- * با توجه به اینکه محل تزریق می‌تواند بر سرعت جذب انسولین تأثیر بگذارد بهتر است تزریقها را در يك زمان مشخص در يك محل انجام دهید.
- * زاویه نیدل در هنگام تزریق از ۴۵-۹۰ درجه می‌تواند متغیر باشد.
- * زاویه محل تزریق را با توجه به صخامت بافت چربی محل تزریق در نظر بگیرید.
- * با توجه به اینکه تزریق به صورت زیر‌جلدی انجام می‌شود، نباید محل تزریق شده برآمده شود.
- * در صورت برآمده شدن محل تزریق عمق تزریق کم بوده و داخل‌جلدی بوده است.
- * چنانچه تجمع بافت چربی در قسمت شکم زیاد است بهتر است جهت تزریق استفاده نشود.
- * محل تزریق را به گونه‌ای جمع کنید که از عضله فاصله بگیرد.
- * نیدل را سریع وارد بوسیت کنید.
- * سرنگ را به آرامی تخلیه کنید.
- * پس از آنکه سرنگ کاملاً تخلیه شد ۱۰ ثانیه تأمل کنید.
- * نیدل را به صورت مستقیم و سریعاً خارج کنید.
- * از مالش، گرم و یا سرد کردن محل تزریق خودداری شود.




تزریق به وسیله PEN:

- تاریخ مصرف ، نوع و سلامت انسولین را چک کنید.
- * انسولینهای LANTUS و NOVORAPID "کاملاً" شفاف و انسولین NOVO MIX به صورت یکنواخت و بدون ذرات کریستال باشد.
- انسولین در حال مصرف بیرون از بخجال و دمای ۸-۲۵ سانتی گراد نگهداری می شود.
- * انسولین در حال استفاده را مجدداً "داخل بخجال نگذاشته و از نور خورشید و آفتاب نیز محافظت کنید.
- فلمهای انسولین ذخیره در بخجال نگهداری می شوند.
- جنانجه فرار است فلم جدیدی استفاده شود دو ساعت قبل از بخجال خارج شود.
- * جهت پیشگیری از بخ زدگی انسولین را در قسمت خنک بخجال قرار دهید.

آماده کردن قلم:

- * در صورتی که قلم Novomix را آماده می کنید ابتدا آن را به آرامی کف دستتان بغلطایید و سپس با حرکت مج دست به سمت پایین و بالا آن را مخلوط کنید.

- * پوشش ایمنی نیدل را جدا کرده و آن را امتداد مخزن انسولین گرفته و به صورت مستقیم وارد مخزن انسولین کنید.
- * قبل از هر بار تزریق نسبت ایمنی را انجام دهید.
- * این کار به منظور اطمینان از باز بودن نیدل و انجام هوایگیری ضروری است.
- * دو واحد از دوز انسولین را انتخاب کنید.
- * دربیشن نیدل را خارج کنید.
- * نیدل را رو به بالا گرفته و به مخزن چند ضربه بزنید تا حبابهای هوا به سمت نیدل شوند.
- * قلم را همچنان رو به بالا نگه داشته و دکمه تزریق را تا زمان صفر شدن دوز انسولین بفشارید.
- * خروج انسولین از نیدل را چک کنید.
- * جنانجه انسولین خارج نشد سه مرتبه این کار را تکرار کنید و در صورتیکه هنوز خروج انسولین را از سر نیدل مشاهده نکردید در قدم نخست نیدل را تعویض کنید و سپس سلامت قلم انسولین را بررسی کنید.
- * دوز مورد نیاز جهت تزریق را انتخاب کنید.
- * جنانجه اشتباها" دوز بیشتری انتخاب کردید میتوانید نشانگر را برگردانده و آن را کم کنید.



روش و محلهای تزریق انسولین:

- * جهت تزریق می‌توان از دست‌ها ، شکم ، باسن و ران‌ها استفاده کرد.
- * چنانچه بوسیت تمیز است نیازی به استفاده از الکل نمی‌باشد.
- * در صورتی که از الکل استفاده شد باید اجازه دهید کاملاً "خشک" شود.
- * تزریقها باید با فاصله ۲ سانتی‌متر از هم انجام شود.
- * جهت پیشگیری از لبودیستروفی انسولین را سرد تزریق نکنید و محلی که امروز تزریق شده است تا یک ماه آینده مجدداً تزریق انجام نشود.
- * با توجه به اینکه تزریق به صورت زیر‌جلدی انجام می‌شود، نباید محل تزریق شده برآمده شود.
- * در صورت برآمده شدن محل تزریق عمق تزریق کم بوده و تزریق داخل جلد بوده است.
- * چنانچه تجمع بافت چربی در قسمت شکم زیاد است بهتر است جهت تزریق استفاده نشود.
- * محل تزریق را به گونه‌ای جمع کنید که از عضله فاصله بگیرد.
- * قلم را به صورت کاملاً "عمودی" نگه دارید.
- * نیدل را سریع وارد بوسیت کنید.
- * دوز انتخاب شده را به آرامی تخلیه کنید.

- * پس از آنکه دور انتخاب شده کاملاً "تخلیه شد انگشت خود را همچنان روی دکمه تزریق فشار دهید و ۱۰ ثانیه تأمل کنید.
- * نیدل را به صورت مستقیم و سریعاً خارج کنید.
- * نیدل را از قلم جدا کرده و دور بیندازید.
- * نیدل یک بار مصرف بوده و مجدداً قابل استفاده نمی باشد.
- * چنانچه نیدل از قلم جدا نشود می تواند باعث ایجاد آلودگی و ورود هوا به مخزن شود.
- * از مالش، گرم و یا سرد کردن محل تزریق خودداری شود.



گرد آورندۀ:
بهتاز ریسی
کارشناس پرستاری و
مسئول واحد آموزش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم